



INTRODUÇÃO

Traumatismos nos dentes anteriores são muito frequentes. As consequências são normalmente avulsões, necroses pulpares, fraturas coronais e radiculares. A implantologia tem como opção para estes casos a realização de implantes de carga imediata os quais permitem a preservação do osso e colocação de uma coroa provisória para substituir a peça em falta. As facetas cerâmicas são uma técnica de reconstrução indireta utilizada para restaurar dentes com destruição parcial da coroa, alteração da forma, cor, tamanho e mal posições moderadas permitindo realizar tratamentos com altos requisitos estéticos.

DESCRIÇÃO DO CASO E PLANO DO TRATAMENTO

Paciente do género feminino, 18 anos, sem antecedentes de saúde relevantes, foi encaminhada para a consulta da Pós-graduação de Especialização em Cirurgia Oral da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa após falha do tratamento endodôntico prévio do dente 21 e fratura coronal prévia do 11, atualmente reconstruída em compósito.

Após a avaliação clínica, radiológica e protética foi sugerido como plano de tratamento:

- 1- Exodontia do dente 21 e colocação de um implante com provisionalização imediata,
- 2- Gengivectomia do 11 e 12 para alinhamento da margem gengival,
- 3- Faceta cerâmica no 11 e coroa de zircónia no 21.



FASE I - EXODONTIA E IMPLANTE DE CARGA IMEDIATA



Exodontia minimamente traumática com colocação imediata de implante Straumann 4.1 x 8mm concomitante com preservação alveolar utilizando xenoenxerto de origem bovina, e provisionalização imediata com coroa do dente natural

FASE II - GENGIVECTOMIA

Correção do contorno gengival dos dentes 11 e 12, por gengivectomia, para permitir um sorriso mais harmonioso.



FASE III - COROA E FACETA



Preparação do 11 para faceta e colocação de transfer para moldagem definitiva; prova em resina do 11 e 21; coroa de Zirconia no 21 e faceta em Dissilicato de lítio no 11.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A colocação de implantes com provisionalização imediata é uma opção para restaurar casos clínicos com implicações psicológicas e elevados requisitos estéticos, após necessidade de exodontias dos dentes anteriores. Em conjunto com as facetas em dentes adjacentes, as coroas sobre implantes permitem homogeneizar posição, cor e forma. A utilização de materiais cerâmicos confere resistência, estabilidade da cor e resultados naturalmente estéticos. Deste modo, podemos considerar uma ótima opção para o restabelecimento da função e estética no sector anterior.

BIBLIOGRAFIA

Vieira, W. (2015). Lentes de contato: restaurações minimamente invasivas, na solução de problemas estéticos. Aleph, 41 f. Lemus Cruz, Leticia María, Justo Díaz, Milay, del Valle Zelenenko, Oksana, Fuertes Rufin, Liscary, & León Castell, Claudia. (2009). CARGA INMEDIATA EN IMPLANTOLOGIA ORAL. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 8(3) Recuperado em 30 de julio de 2019, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2009000300017&Ing=es&tIng=es.