

Técnica VISTA no 70 tratamento da recessão gengival-Caso clínico

Maria Prosper *, André Marques, Ana Isabel Moreira, Ricardo Faria Almeida,
FMDUP, Departamento de Periodontologia e Implantologia Oral



ESPECIALIZAÇÃO DE
PERIODONTOLOGIA
& IMPLANTOLOGIA
FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Introdução

A recessão gengival é descrita como a localização da margem gengival livre em direção apical em relação à junção cimento-esmalte. Um dos objetivos da terapia periodontal é corrigir cirurgicamente as recessões gengivais. A eficácia e previsibilidade das diferentes técnicas cirúrgicas são importantes para o paciente bem como para o clínico. Tem sido descrita uma variedade de procedimentos cirúrgicos como métodos eficazes, nos quais se inclui a técnica VISTA (Vestibular Incision Subperiosteal Tunnel Access), de princípios minimamente invasivos, tendo demonstrando sucesso no recobrimento radicular.

Descrição do caso

Paciente do género feminino, 27 anos, com recessão gengival RT2 - 3 mm no dente 31(1). Neste caso decidimos realizar a técnica VISTA juntamente com um enxerto conjuntivo removido da região posterior do palato (2, 3).



Discussão e conclusões

O caso apresentado destaca como a abordagem terapêutica da técnica VISTA em conjunto com o uso de enxerto conjuntivo autólogo.

O resultado clínico demonstrou ser eficaz para o tratamento da recessão gengival. Neste caso, observou-se uma cobertura total dos 3mm iniciais da recessão gengival. Estes resultados, são corroborados pela literatura. A técnica VISTA demonstrou ser uma opção com sucesso no tratamento da recessão gengival.

Uma das vantagens resulta da sua abordagem minimamente invasiva, a qual garante menos trauma e melhor cicatrização dos tecidos, associada a um maior conforto para o paciente.