



## Mesiodente erupcionado – haverá alternativa à extração imediata?

5

Andreia Figueiredo, DDS, MSc, PhD; Mariana Seabra, DDS, MSc, PhD  
Faculdade de Medicina Dentária, Universidade Católica Portuguesa  
asfigueiredo@ucp.pt

**Introdução:** Os mesiodentes são dentes supranumerários, normalmente dismórficos, que surgem na linha média, na zona anterior da maxila, entre os incisivos centrais. Podem ser únicos ou múltiplos, uni ou bilaterais, podem estar erupcionados ou impactados e apresentarem-se numa posição vertical, horizontal ou invertida. A maioria encontra-se retida no maxilar e o seu diagnóstico é realizado radiograficamente.

**Descrição do Caso Clínico:** Doente do género feminino, 4 anos de idade, surge referenciada à consulta de Odontopediatria da FMD-Viseu. Nega tomar algum medicamento, ter alguma alergia ou doença. Ao exame clínico observa-se dentição decídua completa, sem lesões de cárie e com bons hábitos de higiene. O dente 51 apresenta mobilidade aumentada, acima da expectável para a idade. Em palatino do dente 51 observa-se o mesiodente a erupcionar (Fig. 1). Foi feita radiografia periapical, que diagnosticou mesiodente vertical, não invertido (Fig. 2), responsável pela previsível esfoliação precoce do dente 51. Aguardou-se o tempo necessário à esfoliação do 51 e à erupção do mesiodente (Fig. 3 e 4).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

De seguida, e por faltar um tempo longo para erupção do 11, decidiu-se reanatomizar o mesiodente com anatomia de incisivo central decíduo. A restauração foi realizada com resina composta, de cor A1, com recurso a uma coroa de acetato (Fig. 5 e 6). O polimento foi realizado numa segunda consulta, recorrendo a discos Sof-Lex (Fig. 7).



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

O ganho estético é evidente e a prevenção de hábitos deletérios foi atingida de uma forma rápida, simples e eficaz (Fig. 8 e Fig. 9).

Fig. 8



Fig. 9



**Discussão e Conclusões:** Embora o tratamento dos mesiodentes passe obrigatoriamente pela sua extração, é opção do Médico Dentista Odontopediatra escolher o melhor timing para o fazer. A reanatomização destes dentes, no sentido de devolver a auto-estima ao doente e prevenir problemas de dicção e de hábitos parafuncionais, é uma solução que devemos sempre equacionar, após análise cuidada de cada caso.